




Artenportraits

| Art | Merkmale | Lebensraum / Ansprüche |
|---|---|---|
|  <p>Hermelin</p> | <p>Rücken und Körperseiten braun, weisse Kehle und Bauch, im Winterfell ganz weiss, Schwanzspitze im Gegensatz zum Mauswiesel immer schwarz</p> <p>Nahrung: auf Wühlmäuse spezialisiert</p> <p>Das ganze Jahr über zu beobachten</p> | <p>Abwechslungsreiche Lebensräume mit guter Strukturvielfalt</p> <p>Ast- und Steinhaufen dienen als Rückzugsort und Kinderstuben</p> |
|  <p>Gartenrotschwanz ♂</p> | <p>♂ Stirn weiss, Kehle schwarz, Brust orangerot, rostroter Schwanz</p> <p>♀ Gefieder warm hellbraun, Unterseite leicht rostrot; ohne auffällige Zeichnung</p> <p>Nahrung: Insekten und Spinnen</p> <p>Zugvogel: anwesend zwischen Ende April bis Ende August</p> | <p>Streuobstwiesen und sonstige extensive Lebensräume mit gutem Angebot an Bruthöhlen und Insekten</p> <p>Gute Erreichbarkeit der Insekten am Boden z. B. durch offenen Boden oder gestaffelte Mahd</p> |
|  <p>Neuntöter ♂</p> | <p>♂ kastanienbrauner Rücken mit grauem Kopf, Unterseite fein rosa, schwarze Maske</p> <p>♀ brauner Rücken mit graubraunem Kopf, Unterseite cremeweiss mit leichter Querbänderung, schwache Maske bräunlich und nur hinter Auge</p> <p>Nahrung: Grossinsekten und Spinnen</p> <p>Zugvogel: anwesend zwischen Mai bis August</p> | <p>Hecken mit einem hohen Anteil an Dornsträuchern und einem breiten Krautsaum</p> <p>Gutes Angebot an Grossinsekten</p> |

| Art | Merkmale | Lebensraum / Ansprüche |
|--|--|--|
|  <p>Wendehals</p> | <p>♀ ♂ baumrindenfarbiger kleiner Specht; gräuliche Oberseite mit dunklem Längsstreifen; hellbraune Kehle und cremeweisse Unterseite mit schwarzer Musterung</p> <p>Nahrung: hauptsächlich Ameisen</p> <p>Zugvogel: anwesend zwischen April und August</p> | <p>Gute Erreichbarkeit der Ameisen am Boden (z.B. offener Boden, Randbereiche)</p> |
|  <p>Wiedehopf</p> | <p>♀ ♂ Gefieder dreifarbig orange bis zimtbraun, weiss und schwarz; aufstellbare Haube; Schnabel lang und schmal, leicht abwärtsgebogen</p> <p>Nahrung: Grossinsekten</p> <p>Zugvogel: anwesend zwischen April und August</p> | <p>Halboffene Landschaft an besonner, trockener Lage mit Brachflächen</p> <p>Gute Erreichbarkeit der Insekten am Boden</p> |
|  <p>Zaunammer ♂</p> | <p>♂ Gelb gestreifter Kopf mit schwarzer Kehle, Rücken rostbraun</p> <p>♀ ähnlich, aber deutlich schwächere Farben und keine schwarze Kehle</p> <p>Nahrung: Insekten, im Winter Sämereien</p> <p>Ganzjährig anwesend, im Winter aber heimlich</p> | <p>Gute Kraut- und Strauchschicht; Büsche und Einzelbäume</p> <p>Vielfältige Nahrung mit guter Erreichbarkeit</p> |